

PARVOVIROSE CANINA



2. TRANSMISSÃO

Contato com fezes ou vômitos contendo o parvovírus, podendo ocorrer por via respiratória, secreção oral e nasal ou contato direto com outros cães infectados.



* O vírus pode permanecer durante meses em um ambiente ou objetos.



4. DIAGNÓSTICO

Exame de sangue e exame de fezes específicos podem detectar a presença do vírus.



6. PREVENÇÃO E CONTROLE

Temos duas formas de prevenção e controle:

- **IMUNIZAÇÃO PASSIVA:** através do colostro materno, que é considerada a primeira imunização do animal pois é rico em proteínas e anticorpos.
- **IMUNIZAÇÃO ATIVA:** Que é a vacinação propriamente dita. A vacina contra a parvo faz parte de uma vacina polivalente (V8 ou V10) que inclui a prevenção de outras doenças também. Devendo constar obrigatoriamente no calendário de vacinação do seu cão, e seu reforço deve ser feito anualmente.

1. O QUE É?

É uma doença altamente contagiosa causada pelo parvovírus, um vírus muito resistente que se aproveita da imaturidade do sistema imune provocando graves lesões gastrointestinais no animal.




3. SINTOMAS

Os principais sintomas são: vômito, anorexia, apatia, perda de peso repentina, diarreia (com sangue e odor **MUITO** forte), mucosas pálidas e em alguns casos febre.



5. TRATAMENTO

A indicação é internar o animal para garantir o isolamento, evitar a propagação do vírus e proporcionar o cuidado especial que o paciente contaminado precisa, evitando a desidratação e a piora do quadro.



TEMA

Prevenção e controle: Parvovirose
Canina

INTEGRANTES

1. Beatriz Fernandes RA: 8216899
2. Flávia Ribeiro RA: 7756369
3. Izabela de Andrade RA: 8164329
4. Nathalia Marcone RA: 8433093
5. Renan Rocha RA: 5608731
6. Renata Silva RA: 8419841